

Note Title

8/18/2009

Jasson Vindas Díaz

SOBRE ALGUNOS TEOREMAS TAUBERIANOS

CNA

Semana de la Educación
Matemática

Agosto 19, 2009

1. Introducción

El objetivo de estas notas es dar una breve introducción a las ideas básicas de la Teoría Tauberiana. Discutiremos tres teoremas tauberianos, algunas de sus aplicaciones y recientes generalizaciones.

El nombre tauberiano siempre viene asociado a un teorema de tipo Abeliano. En general un teorema de tipo abeliano es aquel que obtiene información asintótica después de aplicar una transformación a una función serie. Por otro lado, los teoremas tauberianos son "recíprocos" de teoremas abelianos, sujetos a hipótesis adicionales no triviales. La mejor manera de entender la naturaleza de este tipo de problemas es analizando casos particulares.

En la Sección 2 discutiremos el célebre teorema tauberiano de Littlewood (1910).

Seguidamente, estudiaremos dos teoremas tauberianos que pueden ser usados para dar pruebas rápidas del famoso teorema de los números primos. La Sección 3 es dedicada a sumabilidad de Lambert, mientras que la Sección 4 tratará sobre el teorema de Ikehara.

Finalmente, en la Sección 5 discutiremos nuevas generalizaciones de estos tres teoremas clásicos.

2. El teorema de Littlewood (1910).

Para entender el contexto de teorema de Littlewood debemos hacer alusión a otros dos teoremas.

2.1 El teorema de Abel (18??)

El teorema de Abel es usualmente enseñado en un curso de Cálculo II; por conveniencia del lector lo crucaremos aquí. Es el prototípo por excelencia de teorema "abeliano".

Teorema 1 (Abel) Supongamos que la serie numérica $\sum c_n$ es convergente,

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} c_n = \gamma.$$

Entonces


$$(2) \lim_{t \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n = \gamma. \quad \text{///}$$

Notese que la convergencia de (1) implica que la serie de potencia $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ tiene

radio de convergencia al menos 1. Así

$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ está definida en el interior del

círculo unitario en el plano complejo



Así el teorema de Abel nos dice que $f(r) \rightarrow f'$ cuando r tiende a 1 sobre el eje real, un segmento radial.

El teorema de Abel sirve como un método elemental para calcular valores numéricos de series.

Ejemplo 1: Encuentre $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$. Note que

esta serie es convergente por otro lado, si $|t| < 1$

$$\log(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} t^n$$

El teorema de Abel nos dice que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \lim_{r \rightarrow 1^-} \log(1+r) = \log 2 \quad //$$

Ejemplo 2: El recíproco del teorema de Abel no es cierto en general. Consideremos

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$$

la cual es divergente, pero

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-t)^n = \frac{1}{1+t} \xrightarrow{t \rightarrow 1^-} \frac{1}{2}$$

Nota 1: Si (2) se satisface. Decimos que la serie es Abel sumable a γ y escribimos

$$(3) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n = \gamma \quad (A)$$

Por el Ejemplo 2, (3) no implica (1). Pero por el teorema de Abel $(1) \Rightarrow (3)$.

2.2 El teorema de Tauber (1897)

El nacimiento de la teoría taubertiana se dio después del siguiente teorema de Tauber, el cual es una especie de reciprocidad del Teorema 1.

Teorema 2 (Tauber, 1897)

Supongamos que

(4)

$$\xrightarrow[t \rightarrow 1^-]{} \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n = \gamma.$$

Si

$$(5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n c_n = 0,$$

entonces $\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \gamma$. //

La condición (5) puede ser expresada con el símbolo de Landau $C_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$. El nombre "teorema tauberiano" y "teorema abeliano" fue creado por los famosos matemáticos británicos G. Hardy y J. Littlewood quienes descubrieron un gran número de teoremas de este tipo en los siguientes 30 años.

Cabe resaltar que el Teorema 2 es muy sencillo de demostrar, es más puede ser dado como ejercicio a un buen estudiante de Cálculo II.

En 1910, Littlewood generaliza el teorema de Tauber. El reemplaza la condición "O" por "O", es decir la hipótesis tauberiana (5) por

$$(6) \exists M > 0 \text{ tq } n |C_n| \leq M, \forall n \geq 1$$

Teorema 3 (Littlewood, 1910)

Si (4) y (5) se satisfacen, entonces $\sum_{n=0}^{\infty} C_n$ es convergente a γ ~~III~~

Notese que el cambio de la hipótesis (5) a (6) parece ser insignificante; sin embargo ¡no lo es! El teorema de Littlewood es mucho más profundo que el de Tauber, y su demostración no es para nada trivial!

Para varias demostraciones de este teorema ver [2, 5, 6, 9, 10, 11].

3. Teorema tauberiano para sumabilidad de Lambert

En esta y la siguiente sección daremos demostraciones rápidas del teorema de los números primos usando herramientas tauberianas.

3.1 Preliminares sobre números primos

El teorema de los números primos asegura que

$$(7) \quad \pi(x) \sim \frac{x}{\log x}, \quad x \rightarrow \infty.$$

donde

$$\pi(x) = \sum_{\substack{p < x \\ p \text{ primo}}} 1 = \# \text{ primos menores que } x.$$

Fue conjeturado empíricamente mediante observaciones numéricas por Gauss, Legendre, y otros. Las primeras demostraciones conocidas se deben al Francés Hadamard y el Belga de la Vallée Poussin (1896). Aunque simultáneas, fueron encontradas independiente mente. Las demostraciones originales pueden

Ser encontradas en el Libro de Edwards [1]

3.2 Una equivalencia del teorema de los números primos.

En su forma (7), la relación asintótica es difícil de manipular. Debido a esto, usualmente (7) es demostrada por medio de funciones y relaciones intermedias. Nosotros usaremos la función de Möbius. Definida como

$$(8) \quad \mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n=1 \\ (-1)^r & \text{si } n=p_1 \cdots p_r \quad (\text{p}_j \text{ son primos}) \\ 0 & \text{si } n \text{ es divisible por el cuadrado de un primo.} \end{cases}$$

Landau (ver [8]) demostró que el teorema de los números primos es equivalente a

a

$$(9) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sum_{n < x} \mu(n) = 0.$$

Usando el símbolo \mathcal{O} de Landau (9) se puede escribir como $\sum_{n < x} \mu(n) = \mathcal{O}(x)$. Landau mismo

demonstró también que si uno logra probar que

$$(10) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n} = 0,$$

obtendría en seguida (9) y por consiguiente (7), el teorema de los números primos.

Para futura referencia necesitaremos el siguiente lema. Usamos la notación $d|n$, para denotar "d divide a n".

Lema 1:

$$\sum_{\substack{d|n}} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } n=1 \\ 0 & \text{si } n \neq 1 \end{cases}$$

Prueba: Si $n=1$, la suma solamente tiene un término $\mu(1)=1$. Supongamos que $n=p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$; así todo $d=p_1^{B_1} p_2^{B_2} \cdots p_k^{B_k}$ ($0 \leq B_j \leq \alpha_j$). Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{d|n}} \mu(d) &= \mu(1) + \mu(p_1) + \cdots + \mu(p_k) + \mu(p_1 p_2) \\ &\quad + \mu(p_1 p_3) + \cdots + \mu(p_1 p_2 p_3) + \cdots + \mu(p_1 \cdots p_k) \\ &= 1 + (-1)^1 k + (-1)^2 \binom{k}{2} + (-1)^3 \binom{k}{3} + \cdots + (-1)^k \binom{k}{k} \\ &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (-1)^j = (1-1)^k = 0. \end{aligned}$$

3.3. El método de Lambert

Diremos que una serie es sumable a un

número γ por el método de Lambert si

$\sum c_n \frac{n t}{e^{nt}-1}$ converge para $t > 0$ y la suma

tiende a γ cuando $t \searrow 0^+$, es decir

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{n t}{e^{nt}-1} = \gamma.$$

En tal caso se escribe

$$(II) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n = \gamma \quad (L).$$

$$\text{Ejemplo 3: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(c_n)}{n} = 0 \quad (L).$$

Por:

$$\sum_{m=1}^{\infty} \mu(c_m) \frac{t}{e^{mt}-1} = t \sum_{m=1}^{\infty} \mu(c_m) \left(\frac{e^{-mt}}{1-e^{-mt}} \right)$$

$$= t \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \mu(c_m) e^{-kmt} \quad ; \quad n = km$$

$$= t \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nt} \left(\sum_{m=n}^{\infty} \mu(c_m) \right)$$

$$= t e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} 0.$$

3.4 El teorema taubesiano para el método de Lambert

Teorema 4: Supongamos que

$$(12) \sum_{n=0}^{\infty} c_n = \gamma \quad (L).$$

Si la hipótesis taubesiana

$$(13) \exists M > 0 \text{ tq } n |c_n| \leq M, \forall n$$

se satisface, entonces

$$(14) \sum_{n=0}^{\infty} c_n = \gamma \quad //$$

Corollario 1: $\pi(x) = \sum_{\substack{p < x \\ p \text{ primo}}} 1 \sim \frac{x}{\log x}$

Pla: Pongamos $c_n = \frac{\zeta(n)}{n}$ en el Teorema 4,

entonces por el Ejemplo 3, (12) se satisface con $\gamma = 1$, evidentemente $n |c_n| \leq 1$. Así

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\zeta(n)}{n^2} = 0,$$

el resto se sigue de los comentarios de la Sección 3.2.

3.5. Comentarios históricos

La primera prueba del Teorema 4 fue dada por Hardy y Littlewood en 1921 [3]. Sin embargo en la demostración misma ellos usaron el teorema de los números primos. Esto motivó la pregunta abierta sobre la posibilidad de hallar una demostración independiente del teorema de los números primos. En 1928 N. Wiener resuelve esta situación insatisfactoria, haciendo una prueba independiente. Es más, estas ideas llevaron a N. Wiener a crear su teoría tauberiana de carácter genérico [14].


4. El Teorema de Ikehara

En esta sección también presentaremos un teorema tauberiano que puede ser usado para dar una prueba rápida del teorema de los números primos. Primero discutamos algunas propiedades de la función Zeta de Riemann.

4.1 La función Zeta de Riemann

Esta función es definida por

$$(15) \zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^z}, \operatorname{Re} z > 1$$



Lema 2: $\zeta(z) - \frac{1}{z-1}$ extiende a una función analítica en $\operatorname{Re} z > 0$.

Prueba: $\zeta(z) = z \int_1^{\infty} \frac{[t]}{t^{z+1}} dt$ (Ejercicio)

($[t]$ significa parte entera), además

$$\frac{1}{z-1} = \int_1^{\infty} \frac{t}{t^{z+1}} dt.$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \zeta(z) - \frac{1}{z-1} &= z \int_1^{\infty} \frac{[t] - t}{t^{z+1}} dt + z \int_1^{\infty} \frac{t}{t^{z+1}} - \int_1^{\infty} \frac{t}{t^{z+1}} dt \\ &= z \int_1^{\infty} \frac{[t] - t}{t^{z+1}} dt + 1, \end{aligned}$$

el último término está bien definido para $\operatorname{Re} z > 0$.

Lema 3: $\zeta(1+ix) \neq 0$, $x \neq 0$. (Ver [1, 6, 8])

4.2. Relación entre la función ζ y los números primos.

La siguiente relación fue descubierta por Euler

$$(16) \quad \zeta(z) = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{(1 - \frac{1}{p^z})}$$

Prue:

$$\prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{(1 - \frac{1}{p^z})} = \prod_{p \text{ primo}} \left(1 + \frac{1}{p^z} + \frac{1}{p^{2z}} + \dots\right)$$

multiplicando todos los productos de la pasada
productoria obtenemos $(16) \blacksquare$

La función zeta de Riemann también está
conectada con $\sum \frac{\mu(n)}{n^z}$, por

$$(17) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^z} = \prod_{p \text{ primo}} \left(1 - \frac{1}{p^z}\right) = \frac{1}{\zeta(z)}$$

Corolario 2: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^z} = \frac{1}{\zeta(z)}$ en continua en

$\operatorname{Re} z > 0$

4.3. El teorema de Ikehara [4].

Teorema 5 (Ikehara 1931) Supongamos que $G(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n^z}$ es convergente para $\operatorname{Re} z > 1$. Supongamos que existe β tq

$$(18) \quad G(z) - \frac{\beta}{z-1}$$

extiende a una función continua en $\operatorname{Re} z = 1$. Entonces

$$(19) \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N c_n = \beta .$$

Corolario 3: El teorema de Ikehara implica que

$$(20) \pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$$

Nota: En la Sección 3.2 indicamos que (20) es equivalente a

$$(21) \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \pi(n) = 0 .$$

Note que (21) se sigue del Corolario 2 y del Teorema 5, donde aquí $\beta = 0$.

5 Notas Sobre Tauberianos para Funciones Generalizadas

Indicamos aquí referencias a la literatura sobre extensiones de los Teoremas 3, 4, y 5., específicamente extensiones en el marco de trabajo de la teoría de funciones generalizadas (distribuciones de Schwartz). Para generalizaciones del teorema de Littlewood en el contexto de transformada de Laplace, y representaciones analíticas de distribuciones ver: [10, 11, 13]. Para generalizaciones del teorema de Tauber ver: [6, 7]. (Ver también [10, Chap 2.]) La generalización del Teorema 4 no ha sido dada, el autor de estas notas conjectura la siguiente adición (para la notación de asintóticos distribucionales y espacios de distribuciones ver la tesis doctoral del autor)

Conjetura 1: Sea $f \in S'([0, \infty))$. Tenemos que

$$(22) \quad \langle f(t), 1 \rangle = \gamma \quad (C)$$

si y solo si las dos siguientes condiciones se satisfacen

$$(23) \quad f(\lambda t) = O\left(\frac{1}{\lambda}\right), \quad \lambda \rightarrow \infty \text{ en } D'(\mathbb{R})$$

y

$$(24) \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \langle f(t), \frac{\varepsilon t}{e^{\varepsilon t} - 1} \rangle = \gamma$$

Referencias

- [1] H.M. Edwards, Riemann's zeta function, Academic press, N.Y., 1994
- [2] G.H. Hardy, Divergent Series, Clarendon Press, 1949
- [3] G.H. Hardy, J.E. Littlewood, On a tauberian theorem for Lambert's series, and some fundamental theorems for the analytic theory of numbers, Proc. London Math. Soc. (2) 19, 21-29.
- [4] S. Ikehara, An extension of Landau's theorem in the analytic theory of numbers, J. Math. and Phys. M.I.T. 10 (1931), 1-12.
- [5] J. Karamata, Über die Hardy-Littlewood'schen Umkehrungen des Abelschen Stetigkeitssatzes, Math. Z. 32 (1930), 319-320.
- [6] J. Korevaar, Tauberian Theory: A Century of Developments, Springer, 2004.
- [7] J. Korevaar, Distributional Wiener-Ikehara and twin primes, Indag. Math. 16 (2005), 37-49.
- [8] E. Landau, Handbuch der Lehre von der Verteilung der Primzahlen, Chelsea Publishing Co., N.Y., 1953
- [9] J.E. Littlewood, The converse of Abel's theorem on power series, Proc. London Math. Soc. (2) 9 (1910), 434-448.
- [10] J. Vindas, Local Behavior of Distributions and Applications, Doctoral Thesis, Louisiana State University, 2009

- [11] J.Vindas, R.Estrada, A tauberian theorem
for distributional pointvalues, Arch. Math. (Basel)
91 (2008), 249-253.
- [12] J.Vindas, R.Estrada, A quick distributional
way to the prime number theorem, Indag. Math,
per appere.
- [13] V.S. Vladimirov, Yu.N. Drozhzhov, B.I. Zav'yalov,
Tauberian Theorems for generalized functions, Kluwer,
Dordrecht, 1988
- [14] N.Wiener, Tauberian Theorems, Ann. of Math.
33 (1932), 1-100.